


## Grubleoppgave - hvilken ball kommer først?



To glatte baner med lik lengde, har "humper" – en oppover hump på bane A og en nedover hump på bane B. Begge humpene har samme form. To baller starter samtidig med samme startfart i hver sin bane. Hvilken ball fullfører banen sin først?

- a) Bane A
- b) Bane B
- c) Begge bruker samme tid

Hvis startfarten er 2 m/s og farten til ballen i bunnen av humpen på bane B er 3 m/s, da er farten til ballen på toppen av humpen på bane A

- d) 1 m/s
- e) >1 m/s
- f) < 1 m/s

## Løsning:

Selv om begge ballene har samme fart på den første horisontale delen av banene, så blir fartene forskjellige i humpene. Farten til ballen på bane B er større enn startfarten i hele humpen, mens farten til ballen på bane A har lavere fart i hele humpen. Derfor vil ballen på bane B fullføre banen først.

Er det slik at fartsøkningen i bunnen av bane B er lik fartstapet på toppen av bane A? Nei, farten er ikke bevart. Energien er bevart. Tapet i kinetisk energi på toppen av bane A, vil være lik økningen i kinetisk energi i bunnen av bane B – hvis det er nok energi til å begynne med.

Den kinetiske energien i starten er mindre enn økningen i kinetisk energi i bunnen av bane B:  $\frac{1}{2} (3^2 - 2^2)$ . Med startfarten 2 m/s vil ballen ikke engang komme til toppen av humpen på bane A.